سوالات داخلی

سوال ۹۰ کنکور ارشد

کدام‌یک از موارد زیر درباره میگرن در دوران بارداری صحیح است؟

الف) در اکثر موارد، علائم میگرن در دوران بارداری بهبود می‌یابد.

ب) خطر سکته مغزی ایسکمیک کاهش می‌یابد.

ج) میزان زایمان زودرس مشابه جمعیت عمومی زنان باردار است.

د) میگرن با کاهش خطر پره‌اکلامپسی و پرفشاری خون بارداری همراه است.

سوال ۹۱ مرحله ۸ ام

خانمی با سابقه میگرن در حال اقدام برای بارداری است. کدامیک از موارد زیر در ارتباط با این اختلال صحیح نمی باشد؟

الف) احتمالا در دوران بارداری میگرن وی بهبود یابد.

ب) در صورت وجود علایم جدید بررسی کامل بیمار باید صورت گیرد.

ج) درمان اولیه در بارداری استامینوفن یا یکی از داروهای NSAID می باشد.

د) احتمال بروز پره اکلامپسی و دیابت حاملگی افزایش می یابد.

سوال ۹۳ ازمون ارشد

نوزاد متولدشده از مادر مبتلا به ویروس واریسلا زوستر، در کدام‌یک از شرایط زیر نیازمند دریافت ایمونوگلوبولین ضد واریسلا است؟

الف) فعال‌شدن مجدد عفونت واریسلا در مادر پس از گذشت چندین سال.

ب) وجود شواهد بالینی ابتلا به واریسلا در مادر طی سه‌ماهه اول بارداری.

ج) وجود شواهد بالینی ابتلا به واریسلا در مادر طی سه‌ماهه دوم بارداری.

د) ابتلای مادر به واریسلا از ۵ روز قبل تا ۲ روز پس از زایمان.

سوال ۹۸ ازمون مرحله ۸ ام

۹۸- در چه بازه زمانی از ابتلای مادر به واریسلا زوستر، توصیه به تجویز گلوبولین ایمیون واریسلا-زوستر به نوزاد می شود؟

الف) ۵ روز قبل تا ۲ روز بعد از زایمان

ب) یک هفته قبل تا یک هفته بعد از زایمان

ج) ۲ روز قبل تا ۵ روز بعد از زایمان

د) ۲ روز قبل تا یک هفته بعد از زایمان

سوال ۸۵ آزمون ارشد

خانم باردار مبتلا به آسم، بیش از دو روز در هفته دارای علائم است. وی ۳ تا ۴ بار در طول شب به علت تنگی نفس و سرفه بیدار می‌شود. حجم بازدمی اجباری در ثانیه اول (FEV1) مساوی یا بیش از ۸۰ درصد مقدار پیش‌بینی‌شده طبیعی است. از نظر شدت آسم، در کدام طبقه قرار دارد؟

الف) مداوم متوسط

ب) مداوم خفیف

ج) مداوم شدید

د) متناوب

سوال ۸۶ ازمون ۷ ام

۸۶- در ارتباط با بیماری آسم در بارداری کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) در اکثر زنان مبتلا، بیماری در بارداری تشدید می یابد.

ب) EFV1 کمتر از ۲۵ درصد مطرح کننده بیماری شدید می باشد.

ج) در موارد آسم خفیف متناوب تجویز کورتیکواستروئیدهای خوراکی معمولا کفایت می کند.

د) خطر اختلالات طیف اوتیسم در زنان مصرف کننده داروهای آسم افزایش می یابد.

سوال ۹۷ آزمون مرحله ۱

۹۷- FEV1 در چه میزانی نشان‌دهنده آسم شدید می‌باشد؟

الف) کمتر از یک لیتر یا کمتر از ۲۰ درصد

ب) کمتر از دو لیتر یا کمتر از ۳۰ درصد

ج) کمتر از ۳۴ درصد

د) کمتر از ۵۰ درصد

سوال ۹۸ آزمون ارشد

کدام گزینه در مورد بیماریهای تیروئیدی در بارداری صحیح است؟

الف) در هیپرتیروئیدی آشکار، درمان با لووتیروکسین انجام میشود.

ب) حاملگی طول کشیده از عوارض و پیامدهای هیپوتیروئیدی است.

ج) در صورت وجود عوارض داروهای مصرفی نیازی به قطع درمان نیست.

د) تیروتوکسیکوز گذرای حاملگی با استفراغ شدید، افزایش T۴ و کاهشTSH همراه است

سوال ۹۸ آزمون مرحله ۴

۹۸- همه موارد زیر در ارتباط با درمان هیپرتیروئیدی در دوران بارداری صحیح هستند، به جز

الف) خطر ناهنجاری‌های جنینی در موارد درمان با متی‌مازول بیشتر از PTU است.

ب PTU در مقایسه با متی‌مازول با میزان کمتری از جفت عبور می‌کند.

ج) درمان با متی‌مازول با افزایش خطر آسیب به کبد همراه است.

د) طبق توصیه انجمن اندوکرینولوژیست‌های بالینی آمریکا، در سه‌ماهه اول بارداری هیپرتیروئیدی با PTU درمان می‌شود.

سوال ۸۲ آزمون مرحله ۸

۸۲- کدامیک از موارد زیر در ارتباط با درمان هیپوتیروئیدی در بارداری صحیح نمی باشد؟

الف) زنان فاقد تیروئید عملکردی به دوزهای بیشتری از دارو نیاز دارند.

ب) درمان ارجح در بارداری لووتیروکسین خوراکی با دوز ۱۰۰ میکروگرم در روز می باشد.

ج) نظارت بیمار به صورت سنجش TSH هر ۸ هفته یکبار صورت می گیرد.

د) دوزهای دارو به گونه ای تنظیم می شود که میزان TSHدر محدوده ۲.۵ میلی یونیت در لیتر بماند.

سوال ۸۹ آزمون ارشد

کدامیک از درماتوزهای حاملگی با پیامدهای نامطلوب جنینی همراه هستند؟

الف) اگزمای حاملگی

ب) پمفیگوئید حاملگی

ج) فولیکولیت خارش دار حاملگی

د) پاپول و پالکهای کهیری خارش دار حاملگی

سوال ۹۹ آزمون مرحله ۴

۹۹- در ارتباط با پمفیگوئید بارداری کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

الف) عود بیماری در بارداری‌های بعدی در مراحل زودتر و به‌صورت شدیدتر رخ می‌دهد.

ب) شیوع سایر بیماری‌های خودایمنی در مبتلایان بیشتر است.

ج) در موارد زودآغاز بیماری، احتمال زایمان پره‌ترم وجود دارد.

د) در ۵۰٪ موارد، به‌دلیل انتقال جفتی آنتی‌بادی‌های IgG، ضایعات در نوزاد ایجاد می‌شود.

سوال ۹۵ آزمون ارشد

در خانم باردار ۲۰ هفته بدون علائم ادراری در آزمایشات روتین بارداری، جواب کشت ادرار حاکی از تعداد کلونی ۵۰۰۰۰ است، کدام اقدام ارجح است؟

الف) تکرار کشت ادرار

ب) درخواست آنتی‌بیوگرام

ج) تجویز نیتروفورانتوئین

د) اقدامی لازم نیست

سوال ۹۱ آزمون ۷ ام

۹۱- در خانم باردار ۶ هفته در اولین ویزیت پره ناتال، باکتریوری بدون علامت تشخیص داده شده است. در این ارتباط کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) درمان در تعداد کمتر ارگانیسم اقدامی عاقلانه است.

ب) در صورت عدم درمان، ۲۵ درصد از زنان دچار بیماری علامت دار می شوند.

ج) درمان بر اساس حساسیت دارویی صورت می گیرد.

د) درمان خطر زایمان پره ترم را در زنان مبتلا کاهش می دهد.

سوال۸۲ ازمون ارشد

کدام گزینه در مورد خانم ۳۴ ساله، G2P2Ab0 مبتلا به تنگی دریچه میترال صحیح است؟

الف) بیمار نیازی به محدودیت فعالیت فیزیکی در بارداری ندارد.

ب) میزان تجویز مایعات در طول لیبر به این بیمار باید بسیار کمتر از حد معمول باشد.

ج) اگر سطح دریچه میترال کمتر از ۲ سانتی‌متر مربع باشد، بیمار در معرض خطر بیشتری قرار دارد.

د) انقباضات رحمی با کاهش حجم خون در گردش، برون‌ده قلب را کاهش می‌دهد.

سوال ۸۸ آزمون مرحله ۷ ام

۸۸- کدامیک از موارد زیر در ارتباط با تنگی میترال در دوران بارداری صحیح ذکر نشده است؟

الف) در صورتی که وسعت ناحیه سطحی میترال به کمتر از ۲.۵ سانتی متر برسد علایم بروز می کند.

ب) سوفل کلاسیک در همه بیماران مبتلا به تنگی میترال شنیده می شود.

ج) در زنانی که سطح دریچه میترال به کمتر از یک سانتی متر مربع می رسد، محدودیت رشد جنین شیوع بیشتری دارد.

د) در زنان مبتلا به تنگی دریچه میترال زایمان به روش واژینال توصیه می شود.

سوالات بارداری و زایمان

سوال ۸ آزمون ارشد

خانم ۲۲ ساله G1، ۳۱ هفته با فشارخون ۱۰۰/۱۶۰ میلی‌متر جیوه و سردرد شدید، از ۲ روز قبل بستری شده است. فشارخون کنترل شده و درمان با کورتیکواستروئید و سولفات منیزیم انجام شده است. هم‌اکنون بیمار از سردرد شدید شاکی است. ختم بارداری چه موقع باید انجام شود؟

الف) با بروز سندرم HELLP

ب) انجام زایمان فوراً

ج) در صورت دکولمان جفت

د) در صورت بروز ادم ریوی

سوال ۱۰ آزمون مرحله ۹

۱۰- خانم G1P0 با سن بارداری ۳۷ هفته، با شکایت سردرد مراجعه کرده است. در بررسی‌ها، فشار خون ۱۵۰/۱۷۵ mmHg، کراتینین سرم ۱.۶ mg/dL و پروتئینوری منفی گزارش شده است. اقدام مناسب چیست؟

الف) شروع سولفات منیزیوم، تجویز هیدرالازین و برنامه ریزی برای ختم حاملگی

ب) بستری و تحت نظر و ختم بارداری پس از اتمام ۳۸ هفته

ج) آموزش علایم هشدار، کنترل فشار خون در منزل و مراجعه در صورت تشدید علایم

د) تجویز بتامتازون و برنامه ریزی برای ختم حاملگی

سوال ۱۱ آزمون مرحله ۳

۱۱- همه موارد زیر از اندیکاسیون های ختم حاملگی در یک زن پره اکلامپتیک با سن بارداری ۳۲ هفته تحت نظر در لیبر می باشد به جز؟

الف) ادم ریه

ب) اولیگوهیدرآمنیوس

ج) درد مداوم اپی گاستر

د) سردرد شدید و مقاوم به درمان

سوال ۱۱ آزمون ارشد

در صورتی که نوزادی مرده به دنیا بیاید و محدودیت رشد و ناهنجاری در او مشاهده نشود و مادر نیز بیماری خاصی نداشته باشد، انجام کدامیک از اقدامات زیر در گام اول ضرورت ندارد؟

الف) فتوگرام

ب) MRI

ج) پاتولوژی جفت

د) بررسی ترومبوفیلی

سوال یک آزمون مرحله ۴

۱- در ارزیابی علل مرده‌زایی، کدام یک از موارد زیر معمولاً ضروری نیست؟

الف) تصویربرداری جنین با فتوگرام و MRI

ب) بررسی پاتولوژی جفت

ج) انجام کاریوتایپ

د) کالبدشکافی (اتوپسی) جنین

سوال ۱۵ ارشد

کدامیک از داروهای گیاهی زیر محرک عضلات صاف است و سبب انقباضات رحمی می‌شود؟

الف) کوهوش سیاه

ب) جینسینگ

ج) جینگوبیلوبا

د) آکیناسه

سوال ۵ ازمون مرحله ۳

۵- مصرف همه موارد زیر در دوران بارداری منجر به افزایش خطر خونریزی می شود به جز؟

الف) جنسینگ

ب) سیر

ج) روغن بادام

د) زنجبیل

سوالات بهداشت

سوال ۳۲ کنکور ارشد

به منظور پیشگیری از عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، کدام نوع پیاده‌روی به میان‌سالان پیشنهاد می‌شود؟

الف) تند حداقل ۳ روز در هفته به میزان ۱۵۰ دقیقه

ب) تند حداقل ۳ روز در هفته به میزان ۱۲۰ دقیقه

ج) متوسط حداقل ۳ روز در هفته به میزان ۱۲۰ دقیقه

د) متوسط حداقل ۳ روز در هفته به میزان ۱۵۰ دقیقه

سوال ۲۳ ازمون مرحله ۹

۲۳- بر اساس دستورالعمل مراقبت های ادغام یافته سالمندان، همه موارد زیر در خصوص پیاده روی صحیح است به جز؟

الف) اگر قند خون بیش از ۳۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد، ورزش نکند.

ب) بهتر است پیاده روی را در دو نوبت صبح و عصر و هر بار ۴۵ دقیقه انجام دهد.

ج) در سالمندانی که ورزش نمی کنند قبل از شروع فعالیت بدنی باید از نظر سلامت ارزیابی شوند.

د) پیاده روی را با سرعت کم شروع کند و به مرور سرعت خود را افزایش دهد.

سوال ۲۸ کنکور ارشد

خانم ۲۰ ساله‌ای گزارش می‌کند که تمایل به برقراری ارتباط با همجنس خود دارد، این حالت بیانگر کدامیک از حالات جنسی است؟

الف) جاذبه

ب) نگرش

ج) ترجیح

د) گرایش

سوال ۳۷ آزمون مرحله ۹

۳۷- در یک فرد هموسکچوال، کدامیک از موارد زیر دچار اختلال است؟

الف) اولویت جنسیتی

ب) جهت گیری جنسی

ج) رفتار جنسی

د) نقش جنسیتی

سوال ۳۷ کنکور ارشد

۳۷- یک ماما در هنگام آموزش‌های دوران بارداری متوجه می‌شود برخی زنان باردار با وجود آگاهی از فواید ورزش در بارداری، ورزش نمی‌کنند. بررسی نشان می‌دهد اطرافیان این زنان ورزش در بارداری را ضروری نمی‌دانند. بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده مناسب‌ترین اقدام کدام است؟

الف) ارائه وسایل ورزشی به زنان باردار برای شروع فعالیت

ب) اصلاح باورهای هنجاری خانواده برای تقویت قصد انجام رفتار

ج) افزایش تعداد جلسات مراقبت دوران بارداری و جدول زمانی برای انجام ورزش

د) افزایش اطلاعات خانواده درباره فواید ورزش در بارداری بدون توجه به عوامل دیگر

سوال ۳۴ آزمون مرحله ۹

۳۴- بر اساس مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده (Theory of Planned Behavior)، اگر یک زن تمایل به فرزندآوری داشته باشد اما همسر او مخالفت کند، کدام‌یک از اجزای این مدل باید مورد بررسی و آموزش قرار گیرد؟

الف) نگرش (Attitude)

ب) نیت رفتاری (Behavioral Intention)

ج) هنجارهای ذهنی (Subjective Norms)

د) کنترل ادراک‌شده (Perceived Behavioral Control)

سوال ۲۹ آزمون مرحله ۸

۲۹- خانم G1P0 تمایل به زایمان واژینال دارد اما همسر وی با این موضوع مخالف است. مناسب ترین مدل تغییر رفتار برای مواجهه با این مانع و مهمترین سازه کدام است؟

الف) نظریه رفتار برنامه ریزی شده-سازه هنجارهای فرد

ب) نظریه رفتار برنامه ریزی شده-سازه نگرش

ج) الگوی باورهای بهداشتی-درک استعداد

د) الگوی باورهای بهداشتی-درک شدت

سوال ۲۱ کنکور ارشد

برای مقایسه میانگین فشار خون بارداری در بین زنان با شاخص توده بدنی در گروه‌های لاغر، طبیعی، اضافه‌وزن و چاق، با فرض برابر نبودن واریانس، از کدام آزمون استفاده می‌شود؟

الف) کای‌دو

ب) من‌ویتنی-یو

ج) کروسکال والیس

د) تحلیل واریانس یک‌طرفه

سوال ۳۹ آزمون مرحله ۹ ام

۳۹- برای مقایسه میانگین وزن نوزاد در بین مادران با شاخص توده بدنی لاغر، طبیعی، اضافه وزن و چاق، با فرض برابر نبودن واریانس بین گروه های مطالعه، استفاده از کدام یک از آزمون های زیر ارجح است؟

الف) کای دو

ب) من ویتنی یو

ج) کروسکال والیس

د) تحلیل واریانس یک سویه

سوال ۳۰ کنکور ارشد

ایمن‌سازی کودکی که اولین مراجعه او در ۴ ماهگی است، طبق دستورالعمل کشوری کدام واکسن باید از برنامه ایمن‌سازی او حذف شود؟

الف) فلج اطفال تزریقی

ب) روتاویروس

ج) پنوموکوک

د) پنتاوالان

سوال ۲۱ آزمون مرحله ۷ ام

۲۱- همه موارد زیر در ارتباط با واکسن روتاویروس صحیح ذکر شده است به جز؟

الف) محل نگهداری واکسن در طبقه میانی یخچال، در دمای ۲تا۸ درجه سانتی گراد است.

ب) اگر شیرخواری تا ۲۰ هفتگی دز اول واکسن روتاویروس را دریافت نکرده باشد، از برنامه واکسیناسیون روتاویروس حذف شده و دزهای دوم و سوم را نیز نباید دریافت کند.

ج) اگـــر شـــیرخوار هنـــگام یا بعد از دریافت واکسن روتا ویروس استفراغ کرد ، نیاز به تکرار واکسن نیست.

د) حداقل سن دریافت نوبت های اول ، دوم و سوم به ترتیب ۲ ، ۴ و ۶ ماهگی است.

سوال ۳۱ کنکور ارشد

کدامیک از اقدامات زیر در سالمندان، با سطح پیشگیری مربوط به آن به‌درستی تطابق دارد؟

الف) پیشگیری از عود مجدد سکته قلبی ـ پیشگیری سطح سوم

ب) بیماری‌یابی و غربالگری در سالمند ظاهراً سالم ـ پیشگیری سطح اول

ج) مشاوره درباره شیوه زندگی سالم برای حفظ سلامت سالمند ـ پیشگیری سطح دوم

د) پرهیز از انجام آزمایش‌ها و چکاپ‌های غیرضروری در سالمندان ـ پیشگیری سطح چهارم

سوال۳۲ آزمون مرحله ۷ ام

۳۲- "کنترل های خانواده بر رفتارهای ضد اجتماعی و دوری از دوستان بزهکار"، در کدامیک از سطوح پیشگیری از بزه کاری در کودکان و نوجوانان قرار دارد؟

الف) نخستین

ب) سطح اول

ج) سطح دوم

د) سطح سوم

سوال ۲۵ آزمون ۸ ام

۲۵- به ترتیب، شستشوی دست ها قبل از مصرف غذا، توزیع سرنگ رایگان بین معتادان تزریقی و تست پاپ اسمیر در کدام سطح از پیشگیری قرار دارند؟

الف) اولیه-اولیه-ثانویه

ب) اولیه-ثانویه-اولیه

ج) اولیه-اولیه-ابتدایی

د) اولیه-اولیه-اولیه