۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

پنجشنبه
۹۶/۳/٤

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

رشته: مطالعات اعتیاد

تعداد سئوالات: ۱۵۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۸

مشخصات داوطلب:

نام:.....

نام خانوادگی: .....

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی،
دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجـود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

مطالعات اعتیاد

کلاس(گروهی و خصوصی)
آزمون آزمایشی
تقویت رزومه
نمره زبان MHLE / MSRT
مشاوره و پشتیبانی
جزوه

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

اختلالات روانپزشکی

۱ـ از نوروترانسمیترهای مسئول در اختلالات روان پزشکی کدام یک در گروه کاتکل آمین ها قرار نمی گیرد؟

الف) دوپامین ب) سروتونین ج) استیل کولین د) نور اپی‌نفرین

۲ـ خانم جوانی به شما ارجاع شده است. طبق شرح حال این خانم مدت ها است که از دست اعضای خانواده غذایی مصرف نمی کند. شب ها نمی خوابد و مرتب با خودش حرف می زند. در این مراجع از نظر علامت شناسی روان پزشکی کدام مورد بیشتر مطرح است؟

الف) دچار توهم است.

ب) هذیان دارد.

ج) دچار disorganized speech است.

د) دچار disorganized behavior است.

۳ـ آقای ۴۰ ساله ای به شما مراجعه می کند. بیمار افسرده، بی‌انرژی، دچار کاهش خواب و اشتها شده است. علامت اخیر از یک ماه قبل شروع شده است. در سابقه بیمار یک دوره بستری به دلیل پرحرفی، کاهش نیاز به خواب، پرخاشگری در بیمارستان روان پزشکی را دارد. مناسب ترین تشخیص برای این فرد ..... است.

الف) اختلال افسردگی اساسی

ب) اختلال دوقطبی نوع یک

ج) اختلال اسکیزوافکتیو

د) اختلال اسکیزوفرنی فرم

۴ـ در مورد فردی که معتقد است «مردم در مورد او صحبت می کنند» و «مجری تلویزیون به رفتارهای او اشاره دارد» کدام اختلال زیر بیشتر مطرح است؟

الف) توهم خودبزرگ بینی

ب) اختلال حافظه و توجه

ج) هذیان ارجاع

د) هذیان بی وفایی

۵ـ در مسمومیت با مواد محرک کدام علائم روان پزشکی بیشتر قابل انتظار است؟

الف) سایکوز ب) خلقی ج) شناختی د) اضطرابی

۶ـ در مورد اختلال اسکیزوفرنیا کدام مورد درست است؟

الف) برای تشخیص وجود توهم و هذیان ضروری است.

ب) شیوع اسکیزوفرنیا در مردان در سنین بالاتر است.

ج) زنان در سنین پایین تری شانس ابتلا به اختلال را دارند.

د) پیش آگهی اسکیزوفرنیا در زنان بهتر از مردان است.

۷ـ برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی وجود کدام علامت ضروری است؟

الف) کاهش خواب ب) کاهش علاقه ج) افزایش اشتها د) خلق تحریک پذیر

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۸ـ شایع ترین عامل مسمومیت با متانول در ایران کدام است؟

الف) مصرف اتانول

ب) در موارد اقدام به خودکشی

ج) کارگران شاغل در کارخانه های رنگ سازی

د) به صورت تصادفی و مصرف اشتباه

۹ـ بر اساس آمارهای رسمی، شایع ترین ماده مخدر مصرفی در ایران کدام است؟

الف) مواد محرک مثل شیشه

ب) الکل

ج) حشیش و توهم‌زاها

د) مشتقات تریاک

۱۰ـ نیکوتین جزء کدام گروه از مواد تقسیم‌بندی می شود؟

الف) محرک ها

ب) توهم زاها

ج) مهار کننده ها (دپرسانت ها)

د) سایر مواد

۱۱ـ تجویز مواد محرک (مثل آمفتامین ها) در درمان کدام اختلال روان پزشکی زیر توصیه می شود؟

الف) برای درمان سوء مصرف شیشه

ب) برای درمان پرفعالیتی و کاهش توجه کودکان (ADHD)

ج) درمان اختلال افسردگی که همراه با پرخوابی و پراشتهایی است.

د) برای تقویت حافظه در کودکانی که اختلال یادگیری دارند.

۱۲ـ مصرف متادون به جایگزینی مواد مخدر در کدام یک از موارد زیر توصیه می شود؟

الف) برای ترک و درمان وابستگی به آمفتامین ها

ب) برای درمان اعتیاد به مواد مخدر در مادران باردار

ج) برای درمان وابستگی به ترامادول

د) برای ترک مصرف همزمان نیکوتین و حشیش

۱۳ـ برای خانمی که مصرف کننده تریاک است و متوجه حاملگی خود شده است، توصیه شما چیست؟

الف) قطع مصرف مواد و تحت نظر قرار دادن او

ب) ادامه مصرف مواد ولی زیر نظر و مراقبت پزشک

ج) شروع درمان نگهدارنده با متادون

د) توصیه و ارجاع برای سقط جنین

۱۴ـ زن جوانی بعد از اولین زایمان نسبت به نوزاد خود بی تفاوت شده است. افکاری برای آسیب زدن بـه نـوزاد در سـر دارد. بی خواب و بی اشتها شده است و مرتب گریه می کند. کدام اقدام زیر مناسب‌تر است؟

الف) این حالت یک اورژانس روان پزشکی است. لازم است بلافاصله به مرکز روان پزشکی ارجاع شود.

ب) بهتر است نوزاد و مادر برای مدتی به حال خود گذاشته شوند تا ارتباط عاطفی شکل بگیرد.

ج) مداخله دارویی خاصی لازم نیست، حمایت اطرافیان و صحبت با مادر مشکل را مرتفع می کند.

د) شروع درمان های شناختی- رفتاری (CBT) بهترین و موثرترین اقدام درمانی است.

کلاس(گروهی و خصوصی) | تقویت رزومه | مشاوره و پشتیبانی
آزمون آزمایشی | نمره زبان MHLE / MSRT | جزوه

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com

@medical_sana

۱۵ـ مرد جوانی با شکایت از اضطراب شدید مراجعه کرده است. مشکل بیمار فکرهای مزاحم و ناخواسته ای است که به ذهن او هجوم آورده اند. مرتب نگران است که ممکن است به بیماری ایدز مبتلا شده باشد. مراجعه مکرر به پزشکان و انجام آزمایشات متعدد داشته است. برای شروع درمان دارویی کدام دسته داروهای زیر مناسب‌تر است؟

الف) آنتی سایکوتیک ها
ب) ضداضطراب های بنزودیازپینی
ج) مهارکننده های بازجذب سروتونین
د) تنظیم کننده های خلقی

۱۶ـ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در مورد کدامیک از موارد زیر است؟

الف) درمان اجباری برای معتادین
ب) تکلیف به دولت برای تعریف و توسعه مراکز مجاز درمان
ج) تشدید مجازات مصرف کنندگان مواد محرک
د) الف و ج صحیح است.

۱۷ـ در ساختار تشکیلاتی مبارزه با مواد مخدر ایران، کدامیک از دستگاه های زیر به عنوان سیاست گذار اصلی تعیین شده است؟

الف) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب) سازمان بهزیستی
ج) پلیس مبارزه با مواد مخدر
د) هیچکدام

۱۸ـ بر اساس سیاست های کشوری، برنامه های «کاهش آسیب در اعتیاد» شامل کدام یک از موارد زیر است؟

الف) جمع آوری معتادان پرخطر و کارتن خواب
ب) توزیع سرنگ و سوزن در محل پاتوق معتادان پرخطر
ج) راه اندازی کمپ های اجباری و ارجاع معتادان به آن مرکز
د) توزیع متادون و شربت تریاک در داروخانه ها

۱۹ـ در مورد نحوه تجویز و طول مدت مصرف داروهای روان پزشکی کدام صحیح است؟

الف) برای جلوگیری از عوارض اعتیادآور داروها بهتر است درمان کوتاه مدت باشد.
ب) برای پیشگیری از عود اختلال (پروفیلاکسی)، درمان نگهدارنده طولانی مدت توصیه می شود.
ج) حداکثر طول مدت مصرف داروها نباید از یک سال تجاوز کند.
د) به دلیل اثر سوء بر جنین و احتمال وابستگی نوزاد، نباید دارو در دوران حاملگی تجویز شود.

۲۰ـ خانم ۲۳ ساله ای از دوران راهنمایی و دبیرستان سابقه «خودزنی» ، «فرار از مدرسه» و مصرف مواد داشته است. موفق به اتمام تحصیلات نشده است و دوستان صمیمی ندارد. در دورانی که حال او خوب است آرام است و ارتباط خوبی با اطرافیان دارد. وقتی حال او بد می شود که معمولا بدنبال مصرف مواد می باشد، اقدام به خودزنی و ابراز تنفر از همه دارد. مناسب ترین تشخیص کدام است؟

الف) اختلال شخصیت ضداجتماعی
ب) اختلال دوقطبی نوع یک
ج) اختلال شخصیت مرزی
د) اختلال افسرده خویی

۲۱ـ کدام ماده زیر بر روی تعداد متنوع تری از واسطه های شیمیایی مغزی اثر می گذارد؟

الف) کوکائین ب) کافئین ج) اوپیوم د) الکل

کلاس(گروهی و خصوصی) | آزمون آزمایشی | تقویت رزومه | نمره زبان MSRT / MHLE | مشاوره و پشتیبانی | جزوه | موسسه علوم پزشکی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۲۲ـ در مورد «درمان های جایگزین» در مصرف مواد کدام مورد درست است؟

الف) «درمان های جایگزین» برای همه انواع مواد تعریف شده است.

ب) مناسب ترین داروها برای درمان جایگزین ترکیباتی هستند که نیمه عمر کوتاه تا متوسط داشته باشند.

ج) داروهایی که به صورت تزریقی استفاده می شوند، ترکیبات مناسبی برای درمان های جایگزین هستند.

د) داروهایی با نیمه عمر طولانی که شروع اثر آنها بطیء و به آهستگی باشد و علائم ترک خفیف تری ایجاد کنند داروی مناسبی برای درمان جایگزین هستند.

۲۳ـ «دلیریوم ترمنس» در چه مرحله ای از مصرف الکل قابل انتظار است؟

الف) مسمویت با اتانول

ب) مسمومیت با متانول

ج) چند روز بعد از قطع مصرف اتانول

د) مسمومیت همزمان با اتانول و متانول

۲۴ـ «Amotivational Syndrome» در مصرف کدام ماده دیده می شود؟

الف) کانابینوئیدها ب) محرک ها ج) توهم‌زا ها د) نارکوتیک ها

۲۵ـ کلوزاپین جزو کدام دسته از داروهای زیر است؟

الف) ضدافسردگی ب) ضد اضطراب ج) ضد صرع د) ضد سایکوز

۲۶ـ اختلال دوقطبی نوع II علاوه بر دوره های عودکننده افسردگی، دارای کدام ویژگی زیر است؟

الف) دوره های هیپومانیا

ب) دوره های مانیا بدون سایکوز

ج) دوره های مانیا همراه سایکوز

د) شخصیت هیپومانیک یا پارانوئید

۲۷ـ برنامه ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه کدامیک از موارد زیر را دربر می گیرد؟

الف) ادغام بستری روانپزشکی در مراکز ترک اعتیاد

ب) یکپارچه کردن مراقبت بهداشت با مراقبت بهداشت روان

ج) باز کردن درهای بیمارستان های روانی و درمان در جامعه

د) یکپارچگی برنامه مدیریت مواد و درمان در منزل

۲۸ـ حملات پانیک در مصرف کنندگان الکل در کدامیک از موارد زیر شایعتر است؟

الف) مصرف اولین بار الکل

ب) مصرف مداوم بیش از ۵ سال

ج) قطع ناگهانی مصرف الکل

د) همراه کردن مصرف الکل با دیگر مواد

۲۹ـ واژه هم-وابستگی (Codependency) به کدامیک از موارد زیر گفته می شود؟

الف) وابستگی به ۲ یا تعداد بیشتر مواد

ب) وابستگی مواد در چند نفر از افراد یک خانواده

ج) وابستگی مواد همراه با ویژگی های شخصیتی وابسته

د) عود مکرر مصرف مواد

مشاوره و پشتیبانی
جزوه
تقویت رزومه
نمره زبان MHLE / MSRT
کلاس(گروهی و خصوصی)
آزمون آزمایشی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۳۰ ـ نظریه فرهنگ اجتماعی مصرف الکل به تاثیر کدامیک از موارد زیر اشاره دارد؟

الف) فضای خانواده

ب) ویژگی های شخصیتی فرد

ج) شخصیت ضداجتماعی فرد

د) مصرف در شرایط پر تنش برای کسب آرامش

روانشناسی پایه و بالینی

۳۱ ـ قوی‌ترین روش مطالعه علمی پدیده ها کدام یک از موارد زیر است؟

الف) همبستگی ب) مشاهده ج) آزمایش د) زمینه یابی

۳۲ ـ در اکثر نورون‌ها، آستانه تحریک حدودا چند میلی‌ولت است؟

الف) ۵۵- ب) ۶۰- ج) ۷۰- د) ۸۰-

۳۳ ـ کدامیک از عصب رسانه (نوروترانسمیتر) های زیر در انگیزش نقش مهمی دارد؟

الف) استیل کولین ب) گابا ج) دوپامین د) سروتین

۳۴ ـ ثبات وزن در کدام مرحله از رشد شناختی پیاژه بدست می آید؟

الف) حسی/ حرکتی ب) عملیات صوری ج) پیش عملیاتی د) عملیاتی عینی

۳۵ ـ کدام یک از مفاهیم زیر در نظریه ذهن، مفهومی پایه‌ای است؟

الف) توجه مشترک ب) زبان ج) تعامل اجتماعی د) یادگیری

۳۶ ـ در این اختلال روانی فرد دائما احساس تنش و بیم دارد، ناتوان در آرام گرفتن است، خواب مختل، سردرد و سرگیجه و تندی ضربان قلب از شکایات شایع است؟

الف) اختلال پانیک (هول)

ب) اختلال وسواسی- اجباری

ج) اختلال هراس

د) اختلال اضطراب فراگیر

۳۷ ـ در کدامیک از اختلالات روانی زیر، قشر پیشانی حدقه‌ای (Orbital-frontal) و هسته های قاعده‌ای نقش عمده ای ایفا می کنند؟

الف) اختلال دوقطبی

ب) اختلال اسکیزوفرینا

ج) اختلال وسواسی- اجباری

د) اختلال افسردگی

۳۸ ـ کدام یک از موارد زیر از مولفه های سرسختی (Hardiness) نیست؟

الف) هوش ب) تعهد ج) چالش د) کنترل

کلاس(گروهی و خصوصی) | تقویت رزومه | مشاوره و پشتیبانی
آزمون آزمایشی | نمره زبان MSRT / MHLE | جزوه
موسسه علوم پزشکی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۳۹ـ افراد دچار صدمه در ناحیه بروکای مغز دچار چه عارضه ای می شوند؟

الف) ناتوانی در درک کلمات
ب) ناتوانی در تلفظ واضح کلمات
ج) اختلال در تنظیم هیجانات
د) اختلال در حافظه کاری

۴۰ـ معروف ترین نظام نمره‌گذاری آزمون رورشاخ کدام است؟

الف) بک ب) کلاپفر ج) مک گرا د) اکسنر

۴۱ـ هدف این نوع پیشگیری کاهش مدت و آثار منفی اختلال روانی پس از وقوع آن است؟

الف) پیشگیری نخستین (Premorbid)
ب) پیشگیری اولیه
ج) پیشگیری ثانویه
د) پیشگیری ثالث

۴۲ـ کدام یک از عوامل درمان بخش زیر در «گروه درمانی» به سبک یالوم قرار نمی گیرد؟

الف) انتقال اطلاعات ب) امیدوار شدن ج) همگانی بودن د) یادگیری شناختی

۴۳ـ حذف محرک ناخوشایند یا آزاردهنده به دنبال یک پاسخ رفتاری، تعریف کدام مفهوم زیر است؟

الف) تقویت مثبت ب) تقویت منفی ج) تنبیه مثبت د) تنبیه منفی

۴۴ـ اطلاعات وارد شده به حافظ کوتاه‌مدت تا چند ثانیه باقی می مانند؟

الف) ۳۰ دقیقه ب) ۵ دقیقه ج) ۶۰ ثانیه د) کمتر از ۳۰ ثانیه

۴۵ـ زمینه «روان‌شناسی قانونی» شامل کدامیک از موارد زیر نمی‌شود؟

الف) بستری شدن در بیمارستان روانی
ب) پیش بینی خطرناک بودن
ج) تعیین صلاحیت افراد برای حضور در دادگاه
د) کمک به بستری شدن اجباری

۴۶ـ در مورد تفسیر آزمون های روان شناسی شخصیت، کدام گزینه غلط است؟

الف) در آزمون MMPI ، مقیاس K نشانه تدافعی و طفره آمیز بودن پاسخگو است
ب) در آزمون MMPI ، مقیاس F میزان پاسخ های غیرمعمول یا کم تعداد را می سنجد
ج) در اکثر پرسش نامه های شخصیت، جمله ها بر اساس نظریه طراح در مورد هر صفت تنظیم می شود
د) روش آزمون سازی MMPI ، روش مصاحبه و آزمایشگاهی بوده است

۴۷ـ در نشانگان خاطره کاذب (False Memory Syndrome) این نوع از خاطره بطور شایع در چه موردی است؟

الف) سوء استفاده جنسی
ب) کابوس شبانه
ج) رقابت با خواهر و برادر
د) تنبیه بدنی

مشاوره و پشتیبانی | تقویت رزومه | کلاس(گروهی و خصوصی)
جزوه | نمره زبان MHLE / MSRT | آزمون آزمایشی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۴۸ـ در ارزیابی روانشناسی بالینی کدام مورد اهمیت کمتری دارد؟

الف) نحوه پوشش درمانگر
ب) فضای محل مصاحبه
ج) احساس ایمنی مصاحبه کننده
د) هم‌جنس بودن مراجع و درمانگر

۴۹ـ کدام مورد زیر برای کاهش تدریجی پاسخ های اضطراب انگیز به محرک ها و غلبه بر رفتارهای غیرنطابقی در مواجهه با ترس کاربرد دارد؟

الف) الگوسازی ب) مواجهه زنده ج) تقویت انتخابی د) حساسیت زدایی منظم

۵۰ـ در روش شرطی سازی بیزارگرایانه (Aversion)، کدام گزینه توضیح مناسبی از عملکرد «تنبیه» است؟

الف) با هدف یادگیری رفتارهای بی خطر بکار می رود
ب) بر جلوگیری از تکرار رفتارهای پرخطر تأثیر می گذارد
ج) باید همراه با پاداش ارائه شود
د) روش غیرموثری در یادگیری است

۵۱ـ کدام یک از انواع هوش، در نظریه سه وجهی استرنبرگ قرار ندارد؟

الف) هوش تحلیلی ب) هوش عملی ج) هوش ریاضی د) هوش خلاقانه

۵۲ـ در مدل شرطی سازی کلاسیک پاولوف، ترشح بزاق از دهان سگ در پاسخ به شنیدن صدای زنگ کدام مورد زیر است؟

الف) محرک شرطی ب) محرک غیرشرطی ج) پاسخ شرطی د) پاسخ غیرشرطی

۵۳ـ برنامه «سرنگ و سوزن» در مداخلات درمانی اعتیاد در کدام سطح پیشگیری قابل تعریف است؟

الف) پیشگیری سطح اول
ب) پیشیگیری سطح دوم
ج) پیشگری سطح سوم
د) همه موارد می تواند صحیح باشد.

۵۴ـ کدام یک از ساختارهای مغزی زیر نقش کلیدی در مدارهای هیجانی نقش دارد و پیش از درگیری قشر مغز، واکنش نشان می دهد؟

الف) هیپوکامپ ب) آمیگدال ج) هسته های قاعده ای د) تالاموس

۵۵ـ رویکردی را که در نگاه به بهداشت روان، اهمیت زیادی برای نیروهای محیطی در ایجاد و کاهش مشکلات قائل است، ..... می نامند؟

الف) روان شناسی بالینی ب) روان شناسی سلامت ج) روان شناسی جامعه نگر د) روان شناسی اجتماعی

۵۶ـ مطالعه ارتباط بین کارکرد مغز و رفتار را ..... گویند؟

الف) روان شناسی طب رفتاری
ب) روان شناسی عصب نگر
ج) روان شناسی اجتماع نگر
د) روان شناسی بالینی

کلاس(گروهی و خصوصی) | آزمون آزمایشی | تقویت رزومه | نمره زبان MHLE / MSRT | مشاوره و پشتیبانی | جزوه

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۵۷ـ در تعریف مفاهیم روانشناسی «به صحیح انجام دادن یک کار پس از آموزش دیدن» چه می گویند؟

الف) توانایی ب) هوش ج) استعداد د) پیشرفت

۵۸ - شایع ترین اختلال روان پزشکی «همبود» با اختلال مصرف مواد کدام است؟

الف) اختلال روان پریشی

ب) اختلال اضطراب

ج) اختلال شخصیت

د) اختلال وابستگی به یک ماده دیگر

۵۹ - طنز یا شوخی (humor) جزء کدام گروه از مکانیسم های دفاعی زیر است؟

الف) نارسی سیستیک - سایکوتیک

ب) ناپخته

ج) نوروتیک

د) پخته

۶۰ - در اختلال شخصیت مرزی کدام مورد زیر وجود ندارد؟

الف) ثبات در هویت و خودانگاره (Self-image)

ب) رفتار و اقدام مکرر به خودزنی یا خودکشی

ج) بی ثباتی در روابط بین فردی

د) نامتناسب و شدید بودن خشم

نوروفارماکولوژی

۶۱ـ سوء مصرف کدامیک از مواد زیر موجب علائمی شبیه اسکیزوفرنیا می شود؟

الف) دکسترومتورفان ب) دکستروآمفتامین ج) کافئین د) ایزوبوتیل نیتریت

۶۲ـ کدامیک از نوروترانسمیترهای زیر در نورو فارماکولوژی اعتیاد بیشترین نقش را دارد؟

الف) دوپامین ب) گابا (GABA) ج) نوراپی نفرین د) سروتونین

۶۳ـ کدامیک از داروهای اوپیوئیدی زیر دارای اثرات آگونیست-آنتاگونیست می باشند؟

الف) نالوکسان ب) نالمی فن ج) نالترکسون د) پنتازوسین

۶۴ـ کدامیک از داروهای اوپیوئیدی زیر دارای اثرات مهار بازجذب سروتونین می باشد؟

الف) تاپنتادول ب) ترامادول ج) نالبوفین د) متادون

۶۵ـ در جراحی های قلب کدامیک از اوپیوئیدها بعنوان داروی بیهوشی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند؟

الف) فنتانیل ب) مپریدین ج) نورمپریدین د) لوورفانول

۶۶ـ در کولیک های مجاری صفراوی کدامیک از اوپیوئیدهای زیر قابل استفاده می باشد؟

الف) مرفین ب) دی استیل مرفین ج) مپریدین د) کدئین

مشاوره و پشتیبانی
جزوه
تقویت رزومه
نمره زبان MHLE / MSRT
کلاس(گروهی و خصوصی)
آزمون آزمایشی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۶۷ـ استفاده از ضد دردهای اوپیوئیدی در کدامیک از موارد زیر منع مصرف دارد؟

الف) ضربه سر
ب) دردهای قلبی
ج) دردهای سرطانی
د) دردهای بعد از عمل جراحی

۶۸ـ کدامیک از داروهای اوپیوئیدی زیر توسط پلاسما و استرازهای بافتی متابولیزه شده و نیمه عمر کوتاه دارد؟

الف) رمی فنتالین ب) اکسی کودون ج) نورمپریدین د) بوپره نورفین

۶۹ـ کدامیک از مخدرهای زیر با غلظت بالا موجب تشنج می شود؟

الف) مرفین ب) اکسی مرفین ج) مپریدین د) کدئین

۷۰ـ کدامیک از داروهای مهار کننده باز جذب سروتونین (SSRI) می تواند موجب عوارض قلبی از جمله طولانی شدن زمان QT شود.

الف) سیتالوپرام ب) فلوکستین ج) پاروکستین د) فلووکسامین

۷۱ـ کدامیک از داروهای سه حلقه ای زیر قوی ترین اثر را در مهار گیرنده های موسکارینی دارند؟

الف) نورتریپتی لین ب) دزیپرامین ج) ایمی پرامین د) آمی تریپتی لین

۷۲ـ داروی ضدافسردگی چند حلقه ای میرتازاپین دارای چه مکانیسمی می باشد؟

الف) تحریک گیرنده $5HT_2A$
ب) بلوک گیرنده α_2 و رهاسازی آمین از پایانه عصبی
ج) مهار MAO و افزایش ذخائر وزیکولی نوراپی نفرین و سروتونین
د) مهار انتخابی بازجذب سروتونین

۷۳ـ کدامیک از داروهای ضد افسردگی کمترین تاثیر را روی بازجذب نوراپی نفرین و سروتونین دارد؟

الف) آمی تریپتی لین ب) سله ژیلین ج) بوپروپیون د) پاروکستین

۷۴ـ کدامیک از داروهای ضد جنون زیر موجب هیپرگلیسمی می گردند؟

الف) کلوزاپین ب) ریسپریدون ج) زیپراسیدون د) آری پیپرازول

۷۵ـ کدامیک از داروهای زیر موجب تشدید اسکیزوفرنیا می شود؟

الف) فلوفنازین ب) هالوپریدول ج) کلوزاپین د) آمفتامین

۷۶ـ برای جلوگیری از ترمور (لرزش) اضطرابی کدامیک از داروهای زیر تجویز می شود؟

الف) رزرپین ب) بنزتروپین ج) آمانتادین د) پروپرانولول

۷۷ـ کدامیک از گزینه های زیر در مورد بروموکریپتین صحیح است؟

الف) آگونیست پرقدرت گیرنده دوپامین
ب) آگونیست نسبی گیرنده های D_2
ج) یک داروی غیرارگوت است
د) به صورت تک دارویی در درمان پارکینسون بکار می رود

۷۸ـ کدامیک از داروهای زیر با اثر بر شبکه سارکوپلاسمی عضلات اسکلتی موجب شل شدن عضلات مخطط می گردد؟

الف) باکلوفن ب) تیزانیدین ج) دانترولن د) توکسین بوتولینوم

کلاس(گروهی و خصوصی) | تقویت رزومه | مشاوره و پشتیبانی
آزمون آزمایشی | نمره زبان MHLE / MSRT | جزوه

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۷۹ـ بیش مصرف کوکائین موجب کدامیک از عوارض زیر می گردد؟

الف) آریتمی قلبی و انفارکتوس میوکارد
ب) اتساع عروق و افت فشار خون
ج) مت هموگلوبینمی
د) افزایش بازجذب نوراپی نفرین

۸۰ـ مکانیسم اثر کتامین چیست؟

الف) مهار گیرنده $GABA_A$
ب) تحریک گیرنده $GABA_B$
ج) مهار گیرنده NMDA
د) تحریک گیرنده گلوتامات

۸۱ـ «هپاتوتوکسیسیتی کشنده» عارضه کدامیک از داروهای زیر می باشند؟

الف) والپروئیک اسید ب) لاموتریژین ج) فنی توئین د) توپیرامات

۸۲ـ کدامیک از داروهای ضدتشنج زیر بلوک کننده کانال سدیم می باشد؟

الف) اتوسوکسیماید ب) گاباپنتین ج) کاربامازپین د) والپروئیک اسید

۸۳ـ با استفاده از کدامیک از داروهای زیر می توان ولع مصرف در افراد الکلیک مزمن که قصد ترک الکل را دارند، کاهش داد؟

الف) مهار کننده های سیکلو اکسیژناز
ب) آگونیست گیرنده های سروتونین
ج) آنتاگونیست گیرنده های مو
د) آگونیست گیرنده های آدرنژیک α_1

۸۴ـ کدامیک از موارد زیر در مورد باربیتورات ها صحیح می باشد؟

الف) این داروها بر روی گیرنده های $GABA_A$ در نقطه ای مشابه با بنزودیازپین ها اثر می کند
ب) فلومازنیل آنتاگونیست باربیتورات ها می باشد
ج) باربیتورات ها مدت زمان بازماندن کانال کلر را با واسطه $GABA_A$ طولانی می کند
د) این داروها قادر به مهار اسید گلوتامیک نمی باشند

۸۵ـ تحمل متقاطع (Cross-tolerance) در چه مواردی اتفاق می افتد؟

الف) دارو بطور مزمن مصرف شود
ب) دارو با دوز بالا مصرف شود
ج) در مصرف مزمن مجبور به افزایش دوز دارو می شویم
د) زمانی که تحمل به یک دارو ایجاد شود به تمامی زیرگروه های دارو تحمل ایجاد می شود

۸۶ـ کدامیک از گزینه های زیر مانند $5HT_{1A}$ از کانال پتاسیمی استفاده می نمایند؟

الف) گیرنده دوپامین ب) گیرنده $GABA_B$ ج) گیرنده اوپیوئیدی مو د) گیرنده ماده P

۸۷ـ مصرف بیش از حد کدامیک از مواد زیر به صورت شایع منجر به مرگ و میر در اثر افزایش فشار خون و سکته قلبی می شود؟

الف) کوکائین ب) اکسید نیترو ج) مسکالین د) کانابیس

مشاوره و پشتیبانی | تقویت رزومه | کلاس(گروهی و خصوصی)
جزوه | نمره زبان MHLE / MSRT | آزمون آزمایشی
موسسه علوم پزشکی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۸۸ـ کدامیک از داروهای زیر می تواند با مهار مسیر دوپامینرژیک علائم پارکینسون را نشان دهد؟

الف) متیل فنیدیت ب) هالوپریدول ج) آمفتامین د) لوودوپا

۸۹ـ گیرنده های بنزودیازپین روی کدامیک از گیرنده های زیر قرار دارند؟

الف) گیرنده $GABA_A$ ب) گیرنده $GABA_B$ ج) گیرنده اوپیوئیدی مو د) گیرنده سروتونینی

۹۰ - THC ماده فعال کدام یک از مواد روان گردان است؟

الف) حشیش ب) تریاک ج) مشروبات الکلی د) شیشه

نوروفیزیولوژی

۹۱ـ در مورد هسته های قاعده ای (Basal Ganglia) عبارت صحیح را انتخاب کنید؟

الف) در تنظیم سرعت و دامنه حرکت نقش دارند

ب) بطور مستقل از قشر مغز، در کنترل طرح های پیچیده فعالیت حرکتی نقش دارند

ج) مرکز حفظ تعادل بدن است

د) تخریب آنها تونیسیته عضلات را زیاد می کند

۹۲ـ لرزش در حالت استراحت به علت کمبود کدام میانجی عصبی و در کدام ساختار مغزی است؟

الف) دوپامین آزاد شده در لوب فولیکولو ندولر مخچه

ب) سروتونین آزاد شده توسط پوتامن در گلوبوس پالیدوس

ج) دوپامین آزاد شده توسط جسم سیاه به هسته دم‌دار و پوتامن

د) گابای آزاد شده از هسته دم دار و پوتامن به گلوبوس پالیدوس

۹۳ـ از بین رفتن دید در سمت نازال (بینی) میدان بینایی چشم راست و سمت چپ تمپورال (گیجگاهی) میدان بینایی چشم چپ به علت اختلال در کدام مورد زیر است؟

الف) کیاسمای بینایی ب) عصب بینایی چپ ج) مسیر بینایی راست د) مسیر بینایی چپ

۹۴ـ در مورد مخچه کدام عبارت صحیح است؟

الف) عمل تعادلی مخچه بر عهده لوب قدامی است

ب) فیبرهای خزه ای مهارکننده سلول های دانه‌دار (Grannular) هستند

ج) فیبرهای مرزی اثر تحریکی روی سلول های پورکنژ دارند

د) فیبرهای بالا رونده مهارکننده هسته های عمقی هستند

۹۵ـ نقش سلول های رنشاو (Renshow Cells) در نخاع چیست؟

الف) واگرایی دستور حرکتی به نورون های حرکتی آلفا

ب) دستور حرکتی همزمان به نورون های حرکتی آلفا و گاما

ج) مهار جانبی

د) همگرایی دستور حرکتی به نورون های حرکتی آلفا

مشاوره و پشتیبانی | جزوه | تقویت رزومه | نمره زبان MHLE / MSRT | کلاس(گروهی و خصوصی) | آزمون آزمایشی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۹۶ـ هرگاه جسمی که در میدان دید قرار دارد به چشم نزدیک گردد، برای انجام تطابق:

الف) تحدب عدسی کاهش می یابد

ب) عضله مژگانی منقبض می شود

ج) اعصاب سمپاتیک وارده به عضله مژگانی تحریک می شود

د) مردمک چشم گشادتر می شود

۹۷ـ زمان لازم برای انجام کدامیک از رفلکس های زیر بیش از بقیه می باشد؟

الف) رفلکس خم کننده (Flexor)

ب) رفلکس کششی (Stretch)

ج) رفلکس راست کننده متقاطع

د) رفلکس و تری گلژی

۹۸ـ کدامیک از ترکیبات زیر با اثر بر هیپوتالاموس (مراکز سیری و گرسنگی) سبب کاهش میل به غذا خوردن می‌شود؟

الف) لپتین از معده

ب) اورکسین از هیپوتالاموس جانبی

ج) گرلین از معده

د) انسولین از روده

۹۹ـ در فردی که قادر به فهمیدن کلمات نمی باشد، دچار چه نوع بیماری است و عارضه در کدام ناحیه است؟

الف) آفازی حسی- ورنیکه

ب) آفازی حرکتی- بروکا

ج) دیس لکسی- ورنیکه

د) دیس لکسی- بروکا

۱۰۰ـ در مورد حافظه عبارت صحیح را انتخاب کنید؟

الف) تخریب هیپوکامپ بیشتر سبب فراموشی قبلی می شود. Retrograde Amnesia می شود

ب) در جریان یادگیری و حافظه تعداد نورون ها دستخوش تغییر نمی شوند

ج) سیناپس محل ذخیره حافظه است

د) تسهیل (Facilitation) نقش مهمی در ایجاد حافظه منفی دارد

۱۰۱ـ در نوار مغزی کدام موج فرکانس بیشتر و دامنه کمتر از بقیه دارد؟

الف) آلفا ب) بتا ج) دلتا د) تتا

۱۰۲ـ در مورد رفتار تغذیه می توان گفت.....

الف) تخریب هیپوتالاموس جانبی موجب پرخوری می شود

ب) گرلین ترشح شده از معده متسع شده، سبب کاهش اشتها می شود

ج) فعال شدن بخش مرکزی غده آدرنال (فوق کلیه) سبب کاهش اشتها می شود

د) لپتین ترشح شده از هیپوتالاموس سبب احساس سیری می شود

۱۰۳ـ تخریب کدامیک از ساختارهای زیر سبب کوری کلمات می شود اما باعث کری کلمات نمی شود؟

الف) ورنیکه ب) بروکا ج) شکنج زاویه‌ای د) فاسیکولوس قوسی

مشاوره و پشتیبانی | تقویت رزومه | کلاس(گروهی و خصوصی)
جزوه | نمره زبان MHLE / MSRT | آزمون آزمایشی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۱۰۴ـ در مورد سیستم عصبی اتونوم کدام عبارت درست است؟

الف) تمام نورون های پس عقده ای سمپاتیک داخل زنجیره سمپاتیک قرار دارند
ب) سیستم سمپاتیک دارای نورون های پیش عقده ای کولینژیک است
ج) از انتهای پس عقده ای تمام اعصاب سمپاتیک نورآدرنالین ترشح می شود
د) نورون پس عقده ای پاراسمپاتیک خاجی، آدرنرژیک است

۱۰۵ـ گیرنده های موسکارینی در کدامیک از نواحی زیر وجود دارند؟

الف) غشای پس سیناپسی گانگلیون های سمپاتیک
ب) غشای سلول های غدد عرق کف پا
ج) غشای پس سیناپسی عقده های پاراسمپاتیک
د) غشای عضله اسکلتی در محل اتصال عصب به عضله

۱۰۶ـ در صورت کاهش فعالیت سلول های سروتونرژیک هسته رافه و افزایش فعالیت سلول های گابائرژیک هیپوتالاموس قدامی، فرد وارد چه وضعی از حالات هوشیاری یا خواب و بیداری می شود؟

الف) خواب REM
ب) بیداری
ج) خواب Slow wave
د) خواب REM یا بیداری

۱۰۷ـ کدام ناحیه ارتباطی کورتکس با حافظه کاری مرتبط است؟

الف) ناحیه پاریتو- اکسی پیتو- فرونتال
ب) ناحیه ارتباطی پره فرونتال
ج) ناحیه ورنیکه
د) ناحیه ارتباطی لیمبیک

۱۰۸ـ تحریک پاراسمپاتیک باعث کدام یک از حالات زیر می گردد؟

الف) کاهش ترشح بزاق
ب) انقباض عروق محیطی
ج) افزایش ترشح غدد اشکی
د) کاهش حرکات دستگاه گوارش

۱۰۹ـ در مورد گیرنده های حسی، کدام عبارت صحیح است؟

الف) تابع قانون همه یا هیچ (All or None) هستند
ب) در گیرنده های بینایی شبکیه، نور موجب متوقف شدن پمپ سدیم-پتاسیم می شود
ج) در گیرنده های بویائی، مولکول های شیمیایی بودار سبب باز کردن مستقیم کانال های سدیم و دپولاریزاسیون می‌شود
د) گیرنده های رافینی در علامت دادن حالت مداوم تغییر شکل پوست از قبیل سیگنال های لمس شدید و مداوم اهمیت دارند

۱۱۰ـ قطع نیمه راست نخاع کمری سبب کدام تغییر زیر در فرد می شود؟

الف) فلج پای چپ ، از بین رفتن حس حرارت سمت راست، از بین رفتن حس دقیق سمت چپ
ب) فلج پای راست، از بین رفتن حس در سمت چپ، از بین رفتن حس ارتعاش راست
ج) فلج پای راست، از بین رفتن حرارت سمت چپ ، از بین رفتن حس لمس خام راست
د) فلج پای چپ، از بین رفتن حس درد سمت راست بدن، از بین رفتن حس های وضعیتی سمت چپ

کلاس(گروهی و خصوصی) | آزمون آزمایشی | تقویت رزومه | نمره زبان MHLE / MSRT | مشاوره و پشتیبانی | جزوه

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۱۱۱ـ ریتم آلفای ثبت شده در الکتروانسفالوگرام (EEG) کدام ویژگی زیر را دارد؟

الف) ۲۰ تا ۳۰ موج در هر ثانیه تولید می کند
ب) با باز کردن چشم ها ناپدید می شود
ج) در طی خواب REM ، امواج آهسته‌تر و بزرگ‌تر جایگزین می شود
د) بطور غالب در منطقه فرونتال مغز ثبت می شود

۱۱۲ـ کدامیک از سلول ها در شبکیه با ایجاد مهار جانبی از گسترش جانبی سیگنال بینایی در عرض شبکیه جلوگیری می کند؟

الف) دوقطبی- افقی
ب) افقی- آماکرین
ج) آماکرین- عقده ای (گانگلیون)
د) عقده ای- مخروط ها

۱۱۳ـ در صورتی که سلول های سروتونرژیک هسته رافه و سلول های PGO-on فعال باشند فرد در چه وضعیتی از سطح هوشیاری، خواب و بیداری قرار دارد؟

الف) خواب با امواج آهسته (Slow wave)
ب) خواب REM
ج) وضعیت بیداری
د) وضعیت بیداری یا خواب

۱۱۴ـ کمبود کدامیک از میانجی های عصبی زیر با بیماری پارکینسون همراه است؟

الف) دوپامین ب) گابا (GABA) ج) ماده P د) نوراپی نفرین

۱۱۵ـ همی بالیسموس در نتیجه ضایعه عروقی کدام ناحیه ایجاد می شود؟

الف) مخچه ب) ساب تالامیک ج) آمیگدال د) پاراونتریکولار

۱۱۶ـ کدامیک از موارد زیر از خصوصیات خواب REM است؟

الف) افزایش فعالیت امواج مغزی سدیم و کاهش امواج بتا
ب) حرکت آهسته چشم ها
ج) عدم دیدن رویا
د) افزایش متابولیسم مغز

۱۱۷ـ گلوتامات کدام دو نوع رسپتور پس سیناپسی را فعال می کند؟

الف) رسپتورهای یونوتروپیک گلوتامات iGluR - رسپتورهای دوپامینی D_2
ب) رسپتورهای یونوتروپیک گلوتامات iGluR - رسپتورهای متابوتروپیک گلوتامات mGluR
ج) رسپتورهای استیل کولینی نیکوتینی nAchR - رسپتورهای یونوتروپیک iGluR
د) رسپتورهای متابوتروپیک mGluR - رسپتورهای سروتونینی

۱۱۸ـ پتانسیل پس سیناپسی مهاری (IPSP) بعلت باز شدن کدام نوع کانال های یونی زیر ایجاد می شود؟

الف) کلری وابسته به لیگاند
ب) سدیمی وابسته به ولتاژ
ج) کلسیمی وابسته به لیگاند
د) گلوتاماتی وابسته به لیگاند

کلاس(گروهی و خصوصی) | تقویت رزومه | مشاوره و پشتیبانی
آزمون آزمایشی | نمره زبان MHLE / MSRT | جزوه
موسسه علوم پزشکی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۱۱۹ـ کدامیک از گزینه های زیر بترتیب میانجی درد آهسته و درد سریع است؟

الف) ماده P- دوپامین ب) ماده P- گلوتامات ج) گلوتامات - ماده P د) گلوتامات - دوپامین

۱۲۰ـ تخریب دوطرفه آمیگدال می تواند چه احساسی را ایجاد کند؟

الف) افزایش حس لذت و پاداش
ب) افزایش حس خشم و نفرت
ج) افزایش حس گرسنگی و تشنگی
د) کاهش حس خشم و نفرت

اپیدمیولوژی - آمار

۱۲۱ـ بیماری پیش بالینی Preclinical disease شکلی از بیماری است که:

الف) نشانه‌های بالینی هنوز ظاهر نشده ولی در حال ایجاد هستند.
ب) نشانه‌های بالینی ندارد و پیشرفت آن در جهت تولید نشانه های بیماری نیست.
ج) عامل عفونی به شکل فعال در بدن تکثیر نمی یابد.
د) فرد بیمار از عفونت عاری نشده و عامل بیماری سال‌ها با او خواهد بود.

۱۲۲ـ میانه زمان بقاء (Median Survival Time) عبارت است از:

الف) مدت زمانی که نیمی از بیماران تحت بررسی زنده مانده اند.
ب) متوسط زمانی که بیماران زنده هستند.
ج) متوسط مدت زمانی که نیمی از بیماران در مطالعه بوده اند.
د) متوسط زمانی که صرف بهبودی بیماران می شود.

۱۲۳ـ کدامیک از شاخص های زیر برای بیان شدت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مناسبتر است؟

الف) میزان کشندگی
ب) میزان مرگ اختصاصی
ج) میزان حمله
د) میزان مرگ استاندارد شده

۱۲۴ـ اگر خطر ابتلا به هپاتیت در افراد واکسینه نشده ۵ برابر افراد واکسینه شده باشد، کارائی واکسن چند درصد است؟

الف) ۷۵ ب) ۸۰ ج) ۸۵ د) ۹۰

۱۲۵ـ برای محاسبه شیوع یک بیماری، دانستن کدامیک از موارد زیر ضروری است؟

الف) تعداد دفعات ابتلا
ب) تعداد مبتلایان در زمان مطالعه
ج) جمعیت ابتدای دوره
د) جمعیت پرخطر وسط سال

۱۲۶ـ در مطالعات اپیدمیولوژیک، افزایش توان مطالعه در کاهش کدام مورد موثر است؟

الف) خطای تصادفی ب) مخدوش کنندگی ج) تورش اطلاعات د) تورش انتخاب

کلاس(گروهی و خصوصی) | تقویت رزومه | مشاوره و پشتیبانی
آزمون آزمایشی | نمره زبان MHLE / MSRT | جزوه

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۱۲۷ـ میزان حمله ثانویه (Secondary Attack Rate) عبارت است از:

الف) دومین فردی که در اثر تماس با مورد اولیه بیمار شده باشد.

ب) میزان حمله در افرادی که با موارد ثانویه در تماس بوده اند.

ج) تعداد موارد مرگ تقسیم بر تعداد کل افراد در معرض ابتلا به بیماری.

د) میزان حمله در افراد حساسی که بیماری را در اثر تماس با مورد اولیه گرفته اند.

۱۲۸ـ متوسط افرادی که باید درمان شوند تا از وقوع یک مورد عوارض درمانی جلوگیری شود، چه نامیده می شود؟

الف) Number Needed to Harm

ب) Number Needed to Treat

ج) Absolute Risk Reduction

د) Relative Risk Reduction

۱۲۹ـ از روی کدام‌یک از نمودارهای زیر صدک‌های یک مجموعه داده را می‌توان بصورت تقریبی محاسبه کرد؟

الف) درصد توزیع تجمعی ب) درصد فراوانی نسبی ج) دایره‌ای د) هیستوگرام

۱۳۰ـ اگر توزیع متغیر قند خون در یک جامعه نرمال با میانگین ۹۰ و انحراف معیار ۲۰ واحد باشد حدود چند درصد افراد این جامعه دارای قند خون بین ۹۰ و ۱۱۰ واحد هستند؟

الف) ۶۸ ب) ۳۴ ج) ۹۵ د) ۹۰

۱۳۱ـ برای آزمون استقلال جنسیت و گروه خون افراد (در ۴ سطح) در نمونه‌ای بزرگ، درجه آزادی آزمون مورد استفاده کدام است؟

الف) ۲ ب) ۳ ج) ۷ د) ۸

۱۳۲ـ در کدام‌یک از حالت‌های زیر رابطه بین دو متغیر x و y قوی‌تر است؟

الف) $r = ۰/۵$ ب) $r = -۰/۶$ ج) $r^۲ = ۰/۲$ د) $r^۲ = ۰/۵$

۱۳۳ـ آنالیز واریانس کدام‌یک از موارد زیر را آزمون می‌کند؟

الف) برابری واریانس‌ها

ب) برابری میانگین‌ها

ج) برابری خطای معیارها

د) برابری انحراف معیارها

۱۳۴ـ اگر از شش فرد سیگاری سه نفر و از هشت فرد غیرسیگاری یک نفر به بیماری مبتلا شده باشند برای آزمون ارتباط بین مصرف سیگار و بیماری مذکور کدام روش مناسب‌تر است؟

الف) آزمون علامت ب) آزمون کای- دو ج) آزمون دقیق فیشر د) آزمون مک‌نیمار

۱۳۵ـ اگر شیوع یک بیماری ۷۰ درصد باشد و یک آزمایش تشخیصی در ۶۰ درصد موارد مثبت باشد و حساسیت این آزمایش ۸۰ درصد باشد، ارزش اخباری مثبت آزمایش مذکور تقریبا برابر است با:

الف) ٪۷۵ ب) ٪۷۰ ج) ٪۹۳ د) ٪۸۰

مشاوره و پشتیبانی | تقویت رزومه | کلاس(گروهی و خصوصی)
جزوه | نمره زبان MHLE / MSRT | آزمون آزمایشی

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

جامعه شناسی

۱۳۶ـ کدام نظریه بر رویکرد (Orientation) از طریق زبان مشترک ، که شامل یادگیری رویکردها و نقش‌ها است، تاکید دارد؟

الف) تضاد ب) ساختارگرایی ج) تعامل نمادین د) نظریه سایکوآنالیتیک

۱۳۷ـ در کدام حالت Re-socialization رخ نمی دهد؟

الف) دانشجوی پزشکی شدن
ب) معتاد شدن
ج) قطع نخاع شدن
د) دچار آلزایمر شدن

۱۳۸ـ از نظر مرتون (Robert Merton) ، پزشکی که داروی متادون کلینیک خود را به قیمت آزاد به قاچاقچی می فروشد تا سهام یک بیمارستان را بخرد، در کدام دسته طبقه بندی می شود؟

الف) شعائرگرا
ب) طغیانگر
ج) مبدع (Innovative)
د) هم نوا (Conformist)

۱۳۹ـ از منظر جامعه شناسی، کدام مفهوم زیر در تبیین «خانواده» بکار گرفته می شود؟

الف) موسسه ب) سرمایه ج) تعلق اجتماعی د) طبقه اجتماعی

۱۴۰ـ با توجه به نظریه دورکیم در مورد خودکشی، در شرایطی که انسجام اجتماعی خیلی بالا است، احتمال چه نوع خودکشی افزایش می یابد؟

الف) خودخواهانه ب) آلتروئیستیک ج) هیچک د) هر دو

۱۴۱ـ مهمترین ویژگی نهادینه شدن یک امر اجتماعی چیست؟

الف) همگانی شدن
ب) حمایت دولتی
ج) برگزاری سمینار و جلسه
د) وجود ساختار رسمی در جامعه

۱۴۲ـ کدام عامل زیر در ایجاد روابط همسایگی/محله ای کمترین نقش را دارد؟

الف) زبان و قومیت همگن
ب) شرکت در فعالیت های اجتماعی مرتبط با کودکان
ج) شرکت در انتخابات
د) همیاری و تبادل کمک

کلاس(گروهی و خصوصی) | آزمون آزمایشی | تقویت رزومه | نمره زبان MSRT / MHLE | مشاوره و پشتیبانی | جزوه

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana

۱۴۳ ـ مهمترین ویژگی علم جامعه شناسی چیست؟

الف) به چالش کشیدن باورهای موجود

ب) همکاری با دولتمردان و تسهیل مدیریت اجتماعی

ج) دانشگاهی بودن و توسعه علم

د) بعنوان پایه اولیه علم روان شناسی

۱۴۴ ـ پژوهشگری می خواهد در مورد اعتیاد دانشجویان در ایران مطالعه کند. برای این کار به ۴۰۰ نفر از دانشجویان در کل دانشگاه های ایران مراجعه می نماید تا از ایشان اطلاعات مربوط به خودشان را بپرسد. به این ۴۰۰ نفر ..... گفته می شود.

الف) جمعیت ب) میانگین ج) نمونه د) انحراف معیار

۱۴۵ ـ بررسی ها نشان می دهد که افراد مومن و متاهل کمتر خودکشی می کنند. خودکشی ..... است.

الف) متغیر وابسته ب) متغیر مستقل ج) متغیر فرضی د) شاخص پایه

۱۴۶ ـ نگرش منفی به کلیت یک گروه از مردم را چه می گویند؟

الف) قوم گرایی ب) پیش داوری ج) استثمار د) تبعیض

۱۴۷ ـ معمولا مشهور است کسانی که در یک دانشگاه بخصوص تحصیل کنند، شانس بالاتری برای کسب موقعیت های اجتماعی بالاتر خواهند داشت. این نشانه ای است از .....

الف) کارکرد آشکار

ب) بدکارکردی آشکار

ج) کارکرد نهفته (Latent)

د) بد کارکردی نهفته (Latent)

۱۴۸ ـ مطالعات روابط بین انسان ها در مجموعه فضائی/مکانی و محیط فیزیکی ایشان را ..... می گویند.

الف) روان شناسی محیط ب) انسان شناسی ج) اکولوژی انسانی د) اپیدمیولوژی

۱۴۹ ـ کدام عامل زیر در ایجاد و حفظ نظم اجتماعی موثرتر است؟

الف) مجازات ب) باورها ج) سازمان ها د) قوانین

۱۵۰ ـ در تعریف جامعه شناسی جنسیت (Gender) ، کدام زمینه زیر مورد توجه است؟

الف) یادگیری ب) حمایت اجتماعی ج) تعلق اجتماعی د) بیولوژی

موفق باشید

مشاوره و پشتیبانی | تقویت رزومه | کلاس(گروهی و خصوصی)
جزوه | نمره زبان MHLE / MSRT | آزمون آزمایشی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

کلید نهایی

آزمون پی اچ دی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۹۷ - ۱۳۹۶

مطالعات اعتیاد

موسسه علوم پزشکی سنا

کلاس(گروهی و خصوصی)
آزمون آزمایشی
مشاوره و پشتیبانی
جزوه
تقویت رزومه
نمره زبان MSRT / MHLE

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com
@medical_sana